

# ПРИБАВЛЕНІЕ

къ Нижегородскимъ губерскимъ вѣдомостямъ.

№ 40.

## ИЗВѢСТІЯ.

1. Озимь, престопающее лекар-  
ство.

Озимь есть озимая рожь въ то  
вѣ, когда она осенью или весною  
дѣлавается въ видѣ травы. Для  
употребленія сканивать озимь весною,  
когда она бываетъ вышиною въскель-  
болѣ пяди, (\*) лучше ее соби-  
рать послѣ дождя и высушивать на  
солнцѣ на подобіе сѣна. Озимь содер-  
житъ въ себѣ мучнистое вещество  
получающееся изъ сѣна и крах-  
мала. Она очень питательное, однако  
не варимое для слабаго желудка.  
Она на озимь вѣлѣтъ дивянку, какъ  
и на озимь вѣлѣтъ раствореніи  
существенно сѣна и крах-

мальное начало озими, и пошому на-  
стой этой пишательнѣ, удобоваримѣ,  
дѣйствуетъ целебно, на подобіе дру-  
гихъ травъ, на болѣзненную грудь,  
и служитъ для укрѣпленія шѣла, осо-  
бенно груди. Незавѣданнымъ считаемъ  
изложить здѣсь описаніе целебныхъ  
свойствъ озими, подтвержденныхъ  
наблюденіями нашими въ теченіи про-  
должительнаго времени. Для ушоленія  
кашля и легчайшаго изверженія мо-  
крова изъ легкихъ, прибавляется къ  
настой озими сахару (особенно леден-  
цу), или патоки. Озимь весьма одо-  
бляется въ грудныхъ страданіяхъ,  
продолжительныхъ или происшедшихъ  
отъ случайныхъ простудъ. Она по-  
лезна особенно для молодыхъ людей,  
заболѣвшихъ отъ истощенія тѣлес-  
ныхъ силъ, разслабленія шѣла, и вѣн-  
ствъ съ шѣлою груди, особенно послѣ  
перенесенныхъ горячекъ и преждевре-  
ннаго сарышнѣ пакожныхъ сыпей.  
Въ семъ случаѣ озимь употребляется  
одна, вѣсно всегдашняго пища. Во  
многихъ даже опасныхъ случаяхъ, при

линейная ибра, разная дѣлѣтъ заклю-  
чается между раскиснутымъ большимъ  
и малымъ мальцами.

постоянство и продолжительное употребление оных, благотворное действие ее дѣйствие очевидно. — При совокупномъ видѣ, что есть много, шая вызываемыхъ грудныхъ травъ изъ которыхъ составленъ находящійся въ аптекахъ грудной чай, во всѣхъ травъ свѣжъ слизистыхъ началъ имѣть свойство возбуждающее, поддержка въ себѣ ароматные вещества, и почти ни одна изъ нихъ не имѣетъ свойства прищельнаго въ той степени, какъ оная. Исландскій мохъ, съоль употребляемый въ грудныхъ болѣзняхъ, содержитъ въ себѣ преимущественно питательное вещество и не много вещества слизистаго; въ оныхъ же то и другое начала находяща въ такомъ содержаніи, что съ оныя же не мнѣтъ сравниваться, въ вѣсомъ отношеніи, почти ни одна другая трава.

(Изъ Вологод. Губ. Вѣд.)

2 О приѣхавшихъ и выѣхавшихъ

съ 26 го Сентября по 3-е числа Октября 1842 года)

**Прибыли:** изъ Казани — Флигель-Адъютантъ Полковникъ Бутурлинъ и Коллежскій Секретарь Толстой, изъ села Спасскаго Полковникъ Ушаковъ остановились Кремлевской части; изъ Москвы — Коллежскій Ассесоръ Петровъ, изъ Ярославля — Майоръ Ишенико, изъ Княгинина — омс. Штабсъ-Капитанъ Графъ Толстой, изъ Воронежа — омс. Поручикъ Киреевскій, изъ Казани — Поручикъ Алымовъ, оставались Рождественской части.

**Выѣхали:** въ Шую — Генералъ Майоръ Соловьевъ, въ Казань Майоръ Ишенико, въ Княгинина — Поручикъ Мисеевъ, въ Казань — Поручикъ Алымовъ, въ Москву — Коллежскій Ассесоръ Петровъ, Штабсъ-Капитанъ Графъ Толстой и Поручикъ Киреевскій.